

Informovaný souhlas s poskytnutím anesteziologické péče - Asklepion

Vážená paní, vážený pane,

chystáte se podstoupit operační zákrok, který není bezbolestný, a proto je prováděn v celkové anestezii nebo analgosedaci. Tu Vám poskytne specializovaný lékař-anesteziolog, který se o Vás bude starat v bezprostředním předoperačním období, bude Vás mít v péči během operačního výkonu a v případě potřeby bude spolupracovat v péči o Vás i v pooperačním období. Anesteziolog s Vámi projedná způsob anestezie, bude vás informovat o jeho výhodách, nevýhodách, možných rizicích a případných komplikacích. Prosím, přečtěte si pozorně a v klidu následující informace a přesně a pečlivě zodpovězte otázky týkající se Vašeho zdravotního stavu, aby lékař-anesteziolog, pro Vás mohl vybrat ten nejbezpečnější způsob anestezie.

Celková anestezie (narkóza, „uspání“) je stav vyřazeného vědomí a vnímání bolesti, je to stav podobný spánku. Prostředky, léky označované jako anestetika nebo též narkotika používané k navození tohoto stavu, mohou být podány následujícími způsoby:

- Anestetika mohou být podána do žíly = nitrožilní anestezie. Nitrožilní kanylou je aplikováno rychle působící anestetikum, jehož podání u déle trvajících výkonů může být opakováno nebo podáváno kontinuálně.
- Anestetika jsou podávána inhalací = inhalační anestezie. Směs kyslíku a vzduchu nebo oxidu dusného a parotvorných anestetik je přiváděna do plic.

Oba tyto způsoby se mohou kombinovat nebo doplňovat. Během anestezie zajišťuje anesteziolog průchodnost dýchacích cest. Při úvodu do anestezie je to pomocí obličejové masky, která pevně naléhá na obličej okolo nosu a úst. Již v celkové anestezii je pak pro zajištění dýchacích cest zavedena speciální rourka skrz dutinu ústní do hrtanu-laryngeální maska nebo je použita tzv. intubační rourka, která je zavedena dutinou ústní, mezi hlasové vazy do průdušnice. Obě techniky udržují dýchací cesty volné pro přívod kyslíku a inhalačních anestetik, snižují riziko vdechnutí slin a žaludečního obsahu během operačního zákroku. Pro zavedení intubační rourky je nutné vždy použít látky- svalová relaxancia, které zcela vyřadí svalové napětí a způsobí zástavu volního dýchání.

Během anestezie budete trvale klinicky a přístrojově sledováni. Získané údaje jsou pravidelně hodnoceny a písemně zaznamenávány do protokolu o průběhu anestezie.

Analgosedace je stav navozený podáním uklidňujícího léku-sedativa a léku tlumícího bolest – analgetika. Je to stav charakterizovaný větším či menším útlumem vědomí a vede k odstranění strachu a vnímání bolesti. Podaná sedativa mohou navodit amnesii, tedy stav, kdy si operovaný nepamatuje na průběh provedeného výkonu. Aplikace sedativ a analgetik je prováděna nitrožilně.

Rizika a komplikace

Každý lékařský výkon, stejně jako jakákoliv naše jiná činnost v běžném životě, je zatížen výskytem možných komplikací a přes maximální péči a obezřetnost nelze jejich výskyt zcela vyloučit. Mezi život ohrožující komplikace celkové anestezie lze zařadit nemožnost zajištění průchodnosti dýchacích cest, zatečení a vdechnutí žaludečního obsahu do dýchacích cest a závažné alergické reakce na desinfekční prostředek či léky aplikované do žíly. Mezi méně závažné komplikace v souvislosti s celkovou anestezí řadíme poškození žíly při zavádění žilní kanyly, vznik krevního výronu – modřiny nebo

zánětu v místě vpichu žilní kanyly, bolest v krku, polykací potíže, chrapot po výkonu, poškození uvolněných zubů při zajišťování dýchacích cest, pocit nevolnosti a zvracení po operaci. Riziko závažných komplikací, včetně život bezprostředně ohrožujících stavů, je však extrémně nízké. Naší snahou je možným komplikacím předcházet a pokud se vyskytnou, pak je včas a účinně řešit.

K omezení výskytu komplikací je třeba dodržet následující požadavky v předoperačním období:

- 8 hodin před plánovaným výkonem nejíst pevnou stravu a sladkosti. Poslední jídlo má být jen lehké. Pít můžete jen čiré tekutiny (bez tuku a pevných částí), žádné mléko, ovocné šťávy bez dužiny, nepijte alkohol. Lze pít vodu, slabý čaj.
- 4 hodiny před anestezií nepijte, s výjimkou zapití anesteziologem ordinovaných léků malým množstvím vody.
- Nekuřte nejméně jeden den před operací.
- V den anestezie nepoužívejte kosmetické líčení a lak na nehty.
- Před výkonem sejměte a bezpečně uložte kontaktní čočky, brýle, šperky, především piercing.
- Sejměte a bezpečně uložte snímatelné zubní náhrady, nelze-li zubní náhradu sejmout, upozorněte anesteziologa.
- Anesteziologa upozorněte na léky, které dlouhodobě a pravidelně užíváte.
- Anesteziologa upozorněte na alergie, kterými trpíte.
- Zodpovězte pravdivě všechny otázky anesteziologa, které se vztahují k Vašemu zdravotnímu stavu.
- Přineste s sebou výsledky všech požadovaných předoperačních vyšetření.

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s tímto dokumentem, porozuměl(a) jsem jeho obsahu a informace v něm budu respektovat. Anesteziologický dotazník jsem vyplnil(a) úplně a pravdivě. Jsem si vědom(a) rizik v souvislosti s podáním celkové anestezie (analgesedace) a s navrženým postupem souhlasím.

Informace mně byly poskytnuty jasně, srozumitelně a veškeré moje dotazy mně byly zodpovězeny. Toto prohlašuji při plném vědomí a bez nátlaku

V
.....

dne

Jméno a příjmení klienta:

.....

Datum narození nebo rodné číslo:

.....

.....

podpis lékaře – anesteziologa

podpis klientky, klienta